1. Ответить письменно (в электронном варианте, полным предложением) на следующие вопросы:

1.1. Какова цель оказания первой помощи при ранении?

1.2. Перечислить виды раневых кровотечений?

1.3. Каким образом останавливают кровотечение из раны?

1.4. Дать характеристику абсолютным и относительным признакам раны. Привести примеры.

1.5. Дать определение термину «иммобилизация».

1.6. После оказания первой помощи при ранении следует обратиться в медицинское учреждение для профилактики столбняка?

а) только при укушенных или огнестрельных ранах;

б) только в тех случаях, когда рана или ранящий предмет имели непосредственный контакт с почвой;

в) при любых ранениях.

1.7. В каком порядке проводятся мероприятия первой помощи при ранении?

а) остановка кровотечения, обеззараживание раны, наложение повязки;

б) обеззараживание раны, наложение повязки, остановка кровотечения;

в) остановка кровотечения, наложение повязки.

1.8. Первым действием при оказании первой помощи является:

а) предотвращение возможных осложнений;

б) прекращение воздействия травмирующего фактора;

в) правильная транспортировка пострадавшего.

1.9. Вторым действием при оказании первой помощи является:

а) предотвращение возможных осложнений;

б) прекращение воздействия травмирующего фактора;

в) правильная транспортировка пострадавшего.

1.10. Третьим действием при оказании первой помощи является:

а) предотвращение возможных осложнений;

б) прекращение воздействия травмирующего фактора;

в) правильная транспортировка пострадавшего.

1.11. Правильная транспортировка пострадавшего, находящего без сознания производится:

а) в положении на спине;

б) в положении на животе (при травмах брюшной полости – на боку)

в) с приподнятыми нижними конечностями.

1.12. Положение пострадавшего при проведении сердечно-легочной реанимации:

а) на спине, на ровной непрогибающейся поверхности;

б) оставить то положение, в котором был обнаружен пострадавший;

в) на спине, на кровати.

1.13. При проведении искусственной вентиляции легких (ИВЛ) методом «рот в рот» необходимо:

а) зажимать нос пострадавшего только в случае, если носовые ходы свободны;

б) свободной рукой плотно зажимать нос пострадавшего;

в) нос пострадавшего не зажимать.

1.14. Особенности проведения ИВЛ легких детям:

а) частота вдуваний воздуха и объем вдуваемого воздуха, по сравнению со взрослыми пострадавшими, не меняется;

б) увеличивается частота вдуваний воздуха с обязательным уменьшением объема вдуваемого воздуха;

в) уменьшается частота вдуваний воздуха с обязательным уменьшением объема вдуваемого воздуха.

1.15. Реакция зрачка пострадавшего на свет свидетельствует:

а) об отсутствии сознания;

б) о состоянии биологической смерти;

в) о наличии сознания.

1.16. В каком объеме проводятся мероприятия при прекращении сердечно-легочной деятельности и дыхания у пострадавшего?

а) освобождение дыхательных путей, проведение ИВЛ и непрямого массажа сердца (НМС);

б) проведение НМС;

в) освобождение дыхательных путей, проведение ИВЛ.

1.17. При проведении ИВЛ методом «рот в нос» необходимо:

а) свободной рукой открывать рот пострадавшего для обеспечения выдоха;

б) свободной рукой плотно удерживать нижнюю челюсть пострадавшего, чтобы его рот был закрыт;

в) не проводить никаких манипуляций с нижней челюстью пострадавшего.

1.18. Помогая пострадавшему, граждане Российской Федерации оказывают ему:

а) специализированную помощь;

б) первую помощь;

в) медикаментозную помощь.

2. Данное задание выполнить до 09 $\frac{00}{}$ ч. 21 марта 2020 года.